

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS SÉTIF 1 FACULTÉ DE MÉDECINE



DÉPARTEMENT DE PHARMACIE

**Mémoire De Fin D'étude En Vue De L'obtention Du
Diplôme De Docteur En Pharmacie**

LES ANTICOAGULANTS DANS LA CHIRURGIE CANCEROLOGIQUE

Soutenu publiquement le : 25/06/2024

Présentée et soutenu par :

- HAMDANI DJAWAHER
- KHALGUIA MADIHA
- DJOUADA CHAHIRA

Encadrante : Dr. TAMEKNES.R

Docteur en chirurgie générale

Jury d'évaluation :

Président du jury : Pr. SERRAR.N, Professeur en oncologie médicale.

Examinatrice : Dr. AHMED AZZIM, Maître assistante en pneumophtisiologie.

Examinatrice : Dr. BELLAL.O, Assistante en chirurgie générale.

RESUME

La chirurgie cancérologique est essentielle pour traiter divers stades de cancer, mais elle présente un risque accru de thrombose veineuse profonde (TVP) et d'embolie pulmonaire (EP) en raison de l'état prothrombotique des patients. Pour prévenir ces complications, l'utilisation d'anticoagulants est cruciale. Cette étude examine l'incidence des complications thromboemboliques et hémorragiques postopératoires afin d'évaluer l'efficacité de la gestion péri-opératoire des anticoagulants. Elle est menée auprès de 109 patients admis au Centre Anti Cancer (CAC) de Sétif entre février et avril 2024.

Mots clé : thrombose, anticoagulants, thromboemboliques, hémorragiques.

ABSTRACT

Cancer surgery is essential for treating various stages of cancer, but it presents an increased risk of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE) due to the prothrombotic state of patients. To prevent these complications, the use of anticoagulants is crucial. This study examines the incidence of postoperative thromboembolic and hemorrhagic complications to assess the effectiveness of perioperative anticoagulant management. It is conducted on 109 patients admitted to the Anti-Cancer Center (CAC) in Sétif between February and April 2024.

Key words: thrombosis, anticoagulants, thromboembolic, hemorrhagic.

ملخص

تُعد الجراحة السرطانية ضرورية لعلاج مراحل مختلفة من السرطان، لكنها تعرض المرضى لخطر متزايد للإصابة بتجلط الأوردة العميقة والانصمام الرئوي بسبب الحالة المسببة للتجلط لديهم. لمنع هذه المضاعفات، يعتبر استخدام مضادات التخثر أمرًا بالغ الأهمية. تهدف هذه الدراسة إلى فحص معدل حدوث المضاعفات التجلطية والنزيفية بعد الجراحة لتقييم فعالية إدارة مضادات التخثر في الفترة المحيطة بالجراحة. تم إجراء الدراسة على 109 مرضى تم قبولهم في مركز مكافحة السرطان في سطيف بين فبراير وأبريل 2024.

الكلمات المفتاحية: تجلط الدم، مضادات التخثر، الانصمام الخثاري، النزف.