

UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS SÉTIF 1
FACULTÉ DE MÉDECINE



DÉPARTEMENT DE PHARMACIE

Mémoire De Fin D'étude En Vue De L'obtention
Du Diplôme De Docteur En Pharmacie

LA PRESCRIPTION DES PSYCHOTROPES DANS LA COMMUNE
DE SETIF
CENTRE DE CONSULTATION EXTERNE DE PSYCHIATRIE
BEAU-MARCHE

Soutenu publiquement le : 29/09/2022

Encadrant : Dr.CHERIFI AMINA

Présentée et soutenu par :

NEDJAR Kanza

LECHAA Amina

TABOUCHE Akram

Jury d'évaluation :

Président du jury : PR.TERRA.A. Professeur en medecine de travail,CHU de setif

Examineurs : DR.CHAKRI .DJ docteur en epidemiologie ,CHU de setif

Année Universitaire 2021/2022

RESUME

Resumé:

L'objectif de l'étude était d'évaluer la prescription des médicaments psychotropes dans la commune de Sétif, déterminer les raisons invoquées pour les utiliser, d'identifier les caractéristiques généraux de la population d'étude et les retentissements sur ces derniers et de proposer quelques conseils pour la population générale et pour la réglementation.

Il s'agit d'une étude épidémiologique transversale ayant concerné 150 patients traités au centre de consultation externe psychiatrique de Beau-Marché à Sétif, sur une période allant de 15 février au 23 avril 2022. Les résultats qui ont été collectés à l'aide d'un questionnaire anonyme, valide et administré par interview ; ont montré que : 116 (77,3%) sont de sexe masculin et 34 (22,7%) sont de sexe féminin. La moyenne d'âge est de 48 ans $\pm$ 14 ans, avec un étendu allant de 19 à 81 ans. La moitié 77 (51,3%) des malades est mariée. 58 (38,7%) des malades ont un niveau d'instruction moyen. Parmi les malades en chômage, 39,7% sont de sexe masculin vs 73,5% de sexe féminin. Plus des 2/3 (83,3%) des malades sont assurés. 81 (54%) malades ont des habitudes toxiques. 32 (21,3%) des malades ont déclaré que l'anxiété est le facteur déclenchant principal de la consommation des psychotropes. 50 (33,3%) des malades souffrent de plusieurs effets indésirables malgré cela. Les deux sexes masculins et féminins, déclarent qu'ils souffrent de la dépendance aux psychotropes (91,2%) féminin vs (91,4%) masculin. Les troubles du sommeil restent importants, 102 (87,9%) de sexe masculin. Pour toutes ces causes 65 (43,3%) malades tentent d'arrêter les psychotropes. Seulement 19 (13%) malades partagent le traitement psychotropes avec les proches. 72 (48%) malades savent que l'aide du médecin traitant est nécessaire pour l'arrêt des psychotropes. 95 (81,9%) des patients satisfaits de l'effet des psychotropes sont de sexe masculin vs 30 (88,2%) de sexe féminin. La moitié 75 (50%) des malades pensent que le cerveau est la cible des psychotropes. Les psycholeptiques est la classe la plus prescrite 136 (90,7%). La prise en charge des personnes ayant un traitement psychotrope s'avère indispensable et devrait être remise en question, afin d'améliorer leur santé, leur qualité de vie sociale, et le plus important diminuer leur souffrance.

abstract :

The objective of the study was to evaluate the prescription of psychotropic drugs in the municipality of Sétif, to determine the reasons given for their use, to identify the general characteristics of the study population and the repercussions on them and to propose some advice for the general population and for regulation.

This is a cross-sectional epidemiological study involving 150 treating patients at the outpatient psychiatric consultancy center of Beau-Marché in Sétif, over a period from February 15 to April 23, 2022. The results were collected using an anonymous questionnaire, valid and administered by interview; showed that: 116 (77.3%) are male and

34 (22.7%) are female. The average age is 48 ± 14 , with a range from 19 to 81. Half 77 (51.3%) of the sick are married. 58 (38.7%) of the sick have an average level of education. Among unemployed patients, 39.7% are male vs. 73.5% female. More than 2/3 (83.3%) of patients are insured. 81 (54%) patients have toxic habits. 32 (21.3%) of patients reported that anxiety is the main trigger for the use of psychotropic drugs. 50 (33.3%) of patients suffer from several adverse effects despite this Both male and female sexes, report that they suffer from addiction to

psychotropic (91.2%) female vs (91.4%) male. sleep disorders remain significant, 102 (87.9%) male. for all these causes 65 (43.3%) patients try to stop psychotropic drugs. Only 19 (13%) patients share psychotropic treatment with relatives. 72 (48%) patients know that the help of the attending physician is necessary for the cessation of

Psychotropic drugs. 95 (81.9%) of patients satisfied with the effect of psychotropic drugs are male vs. 30 (88.2%) female. Half 75 (50%) of patients think that the brain is the target of psychotropic drugs. Psycholeptics is the most prescribed class 136 (90.7%).

The care of people with psychotropic treatment is essential and should be questioned, in order to improve their health, their quality of social life, and most importantly reduce their suffering.

ملخص

هدفت الدراسة إلى تقييم ما تم من وصف للأدوية للأمراض العقلية في بلدية سطيف، وتحديد الأسباب المقدمة لاستخدامها، والتعرف على الخصائص العامة لمجتمع الدراسة وانعكاساتها عليهم، واقتراح بعض النصائح لعامة السكان وتنظيمها.

هذه دراسة وبائية مقطعية تشمل 150 مريضاً يعالجون في مركز الاستشارات النفسية للمرضى الخارجيين في Beau-Marché في سطيف، على مدى الفترة من 15 فبراير إلى 23 أبريل 2022. تم جمع النتائج باستخدام استبيان مجهول الهوية، صالح ومدار عن طريق المقابلة. أظهر أن 77.3% (116) من الذكور و 22.7% من الإناث 34.

متوسط العمر هو 48 ± 14 ، مع مجموعة من 19 إلى 81. ونصف المرضى متزوجون 51.3%. ومن بين المرضى العاطلين عن العمل، 39.7% في المائة من الذكور مقابل 73.5% في المائة من الإناث. أكثر من 2/3 (83.3%) من المرضى مؤمن عليهم 54.81% المرضى لديهم عادات سامة.

أفاد 21.3% من المرضى أن القلق هو الدافع الرئيسي لاستخدام المؤثرات العقلية (33.3%) 50 من المرضى يعانون من العديد من الآثار الضارة على الرغم من ذلك، أفاد كل من الجنسين الذكور والإناث أنهم يعانون من الإدمان على المؤثرات العقلية 91.2% الإناث مقابل 91.4% الذكور.

لا تزال اضطرابات النوم كبيرة (87.9%) 102 من الذكور. لكل هذه الأسباب 65 مريضاً (43.3%) يحاولون إيقاف المؤثرات العقلية.

فقط 13% من المرضى يشاركون العلاج بالمؤثرات العقلية مع الأقارب. 72 من المرضى يعرف أن مساعدة الطبيب المعالج ضرورية لوقف العلاج بالمؤثرات العقلية.

المؤثرات العقلية 95% (81.9%) من المرضى الراضين عن تأثير المؤثرات العقلية هم من الذكور مقابل (88.2%) 30% من الإناث. نصف 75 من المرضى يعتقدون أن الدماغ هو هدف المؤثرات العقلية.

المضادات الذهنية هي الفئة الأكثر وصفاً 90.7%.

إن رعاية الأشخاص الذين يتلقون العلاج بالمؤثرات العقلية أمر ضروري ويجب التشكيك فيه، من أجل تحسين صحتهم ونوعية حياتهم الاجتماعية، والأهم من ذلك تقليل معاناتهم.